



KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS



PREVENCIÓN DE PICADURAS DE ABEJORROS

- Mantener siempre la calma cuando se trabaja con los abejorros.
- No molestar a la colmena y evitar moverla a no ser por caso de mantenimiento.
- Cuando abra la colmena, no la abra viendo de frente.
- Si recientemente se colocó la colmena espere unos minutos antes de abrirla, ya que se encuentran estresadas.
- Evitar corrientes repentinas de aire, como respirar dentro de la colmena.
- Evitar aromas de perfumes, alcohol, jabones, aromatizantes, aftershaves, etc.
- Evitar el uso de anillos, brazaletes y relojes que pueden originar comportamiento agresivo, por el olor del material oxidado entre la piel.

Generalidades sobre picaduras y reacciones **NO alérgicas**

- Síntomas: Hinchazón en la zona de la picadura, piel enrojecida con picor, leve hinchazón que puede durar horas o días.
- Tratamiento:
 - o No es necesario tratamiento médico
 - o Si la picadura fue en una zona extremadamente sensible (ojos, nariz), puede tomar algún analgésico como Ibuprofeno o Paracetamol o una aspirina. Puede aplicar sobre la picadura “After bite”. (Ver Lista de Medicamentos contra picaduras de Abejorros).

NOTA: PARA PICADURAS CON REACCIONES MÁS SEVERAS, ACUDIR AL MÉDICO. EL USO DE MEDICAMENTOS ES RESPONSABILIDAD DE QUIEN LO UTILIZA. NOSTROS LE RECOMENDAMOS SIEMPRE ACUDIR A SU CLÍNICA MÁS CERCANA PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA. La “Guía Rápida en Caso de Picaduras de Abejorro”, sólo se presenta como una alternativa para retardar la reacción alérgica de la picadura. Koppert México no se responsabiliza por uso indebido de los medicamentos, ni en caso de intoxicación de ellos.



GUÍA RÁPIDA EN CASO DE PICADURAS DE ABEJORRO

COLOR DE ALERTA	SINTOMATOLOGÍA	MEDICAMENTO Y DOSIS
REACCIÓN LEVE	Pequeñas ronchas o comezón en el cuerpo	Compresa fría para disminuir la hinchazón. ADULTOS: 1 tableta de Paracetamol de 500mg cada 6 a 8 horas por no más de 5 días.
REACCIÓN MODERADA	Crecimiento exagerado de la roncha o Abundantes ronchas y comezón generalizado	ADULTOS: 1 tableta de Ibuprofeno (desinflama y disminuye el dolor) cada 6 a 8 horas por no más de 3 días. 1 gragea de Avapena (antihistaminico, neutraliza la reacción alérgica) cada 8 hr o cada 12 horas según la respuesta de mejora.
REACCIÓN SEVERA	Dificultad para respirar , garganta y lengua dormidos, con o sin abundantes ronchas. Angustia.	URGENTE! LOCALICE UN CENTRO DE SALUD O CLÍNICA CERCANA RECIBIR ATENCIÓN ESPECIALIZADA. PARA DISMINUIR LA REACCIÓN ALÉRGICA EN LO QUE LLEGA AL MÉDICO PUEDE TOMAR UNA GRAGEA DE AVAPENA, TOMANDO EN CUENTA QUE ES BAJO SU RESPONSABILIDAD.

Advertencia ! Aunque los medicamentos de esta lista y las dosis de aplicación fueron recomendadas por un médico experto, se recomienda BUSACAR ATENCIÓN MÉDICA PARA EL USO DE ELLOS.



LISTA DE MEDICAMENTOS CONTRA PICADURAS DE ABEJORROS

ADVERTENCIA!! Esta lista de medicamentos se realizó en base a la recomendación de un médico experto y de las dosis descritas en cada medicamento. KOPPERT NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DE ELLOS. SE RECOMIENDA QUE EN CASO DE REACCIÓN ALÉRGICA BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. La finalidad de esta guía es únicamente auxiliar en caso de una emergencia; previamente usted debe llamar a un experto para consultar las dosis y los medicamentos que debe utilizar.

COLOR DE ALERTA	MEDICAMENTO	INGREDIENTE ACTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	UTILIDAD	RESTRICCIONES DE USO
Reacción Leve	After Bite (líquido)	Amoniaco	Cutáneo		Eficaz contralas molestias leves ocasionadas por picaduras de insectos.	
Reacción Leve	Paracetamol o Tempra	Paracetamol o Acetaminofen	Oral	ADULTOS: 325 a 650 mg cada 6 a 8 hr NIÑOS: 15 mg por kilo de peso, cada 6 a 8 hr	Analgésico y Antipirético eficaz para el Dolor y la fiebre.	No administrar en caso de padecer enfermedades del riñón o hígado. NO CONSUMIR ALCOHOL DURANTE LA TOMA DEL MEDICAMENTO.
Reacción Leve	Ibuprofeno o Motrin	Ibuprofeno	Oral	ADULTOS: 200 a 400 mg cada 6 a 8 hr NIÑOS: El motrin contiene jeringa dosificadora de acuerdo al peso del niño.	Analgésico y antiinflamatorio eficaz contra el dolor acompañado de hinchazón.	No administrar en pacientes con alteraciones oculares ni si están siendo manejados con cumarina. Si tiene problemas gastrointestinales tomarlo con alimentos.
Reacción Leve	Benadryl	Difenhidramina	Oral	ADULTOS Y NIÑOS MAYORES DE 12 AÑOS: 10 a 20 ml cada 4 o 6 hrs. NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS: 5 a 10ml CADA 4 O 6 hr. NIÑOS DE 2 a 6 AÑOS: 2.5 ml cada 4 a 6 hr.	Antihistamínico eficaz contra reacciones alérgicas, comezón o dolor por picaduras de insectos.	No administrar durante embarazo y lactancia

COLOR DE ALERTA	MEDICAMENTO	INGREDIENTE ACTIVO	APLICACIÓN	DOSIS	UTILIDAD	RESTRICCIONES DE USO
Reacción Leve o Moderada	Avapena grageas	Cloropiramina	Oral	ADULTOS: 1 gragea 2 o 3 veces al día. Niños de 5 a 10 años, 2 a 3 grageas al día.	Antihistamínico eficaz contra reacciones alérgicas o picaduras de insectos.	No administrar en niños menores de 5 años. No conducir durante la toma de este medicamento.
Reacción Moderada CONSULTE A SU MÉDICO	Dexametasona solución inyectable	Hidrocortizona	Intramuscular	ADULTOS: Hidrocortizona de 500mg inyección intramuscular en la nalga. NIÑOS MENORES DE 40 kg: Hidrocortizona de 250 mg inyección intramuscular en la nalga.	Glucocorticoide e inmunosupresor eficaz contra inflamaciones severas.	No aplicar en caso de úlcera, glaucomas, diabetes mellitus, tuberculosis, osteoporosis, síndrome de Cushing.No exceder de 1.5 mg por vía oral al día.
Reacción Severa CONSULTE A SU MÉDICO	ADULTOS: EpiPen con autoinyector NIÑOS: EpiPen Jr. con autoinyector	Epinefrina	Intramuscular, SOLO EN CASO DE EMERGENCIA POR CHOQUE ANAFILÁCTICO	ADULTOS: 0.3 ml (0.3 mg) NIÑOS: 0.15 mg para niños de 15 a 30 kg	Dilata los vasos vasculares, acelera las pulsaciones y dilata los bronquios haciendo posible la respiración adecuada.	No aplicar en caso de problemas cardiacos. Nunca debe aplicarse por medio intravenoso.
<p>ADVERTENCIA!! Esta lista de medicamentos se realizó en base a la recomendación de un médico experto y de las dosis descritas en cada medicamento. KOPPERT NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO INDEBIDO DE ELLOS. SE RECOMIENDA QUE EN CASO DE REACCIÓN ALÉRGICA BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA. La finalidad de esta guía es unicamente auxiliar en caso de una emergencia; previamente usted debe llamar a un experto para consultar las dosis y los medicamentos que debe utilizar.</p>						